

FICHA SOBRE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA ESCUELA
I.E.S. MONTERROSO
Estepona

FOTO

NOMBRE:
APELLIDO 1º:
APELLIDO 2º:
PESO: EDAD:
CURSO:

TELÉFONOS DE CONTACTO
Domicilio:
Padre móvil:
Madre móvil:
Padre trabajo:
Madre trabajo:

Este/a niño/a tiene

ALERGIA A ALIMENTOS

ALERGIA AL LÁTEX

CAUSANTES:

LECHE DE VACA

HUEVO:

PESCADOS:

LEGUMBRES:

FRUTOS SECOS:

FRUTAS:

MEDICAMENTOS:

MATERIAL ESCOLAR:

GUANTES PARA LA HIGIENE

MATERIAL DEPORTIVO:

MATERIAL DE JUEGOS:

MATERIAL DE PLÁSTICA:

OTROS:

INGESTIÓN

CONTACTO

INHALACIÓN

FICHA SOBRE ENFERMEDADES CRÓNICAS EN LA ESCUELA

I.E.S. MONTERROSO

Estepona

¡REACCIÓN ALÉRGICA!

Asmático No

Sí ! Riesgo mayor para reacciones graves.

PASO 1: EVALUAR Y TRATAR (1)




Picazón en boca, leve sarpullido alrededor de la boca o labios, boca hinchada

ADMINISTRAR
A rellenar Alergólogo/Pediatra




Urticaria, ronchas, sarpullido, picor o hinchazón de extremidades u otra zona del cuerpo



Naúseas, dolores abdominales, diarreas, vómitos.




Picor de ojos, ojos rojos, lagrimeo, picor nasal, estornudos de repetición, moqueo abundante




Garganta cerrada, ronquera, tos repetitiva, lengua/párpados/labios/orejas hinchados

ALTELLUS 0,15/0,30



Respiración entrecortada, tos repetitiva, tos seca, agotamiento, labios o piel azulada.

ALTELLUS 0,15/0,30



Pulso débil, presión arterial baja, desvanecimiento, palidez, labios o piel azulada

ALTELLUS 0,15/0,30

1) Ante reacciones rápidamente progresivas, aunque los síntomas presentes no sean graves (los recogidos en las viñetas 1 a 4) se recomienda administrar adrenalina (ALTELLUS 0,15/0,30) precozmente para evitar la progresión a una reacción grave (síntomas recogidos en las viñetas 5, 6 y 7).

2) En niños con síntomas recogidos en la viñeta 7 (afectación cardiovascular) es conveniente mantenerlos tumbados boca arriba y con los pies en alto.

3) Después de administrar la medicación SIEMPRE se debe llevar al niño a una instalación médica

PASO 2: AVISAR

LLAMADA DE EMERGENCIA

1. NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SOLO

2. **Llame a urgencias** (Telf.: _____) y comunique que es una reacción alérgica.

3. Aun cuando el padre/representante legal no pueda ser contactado, no dude en medicar y llevar al niño a una instalación médica.

1/2

D/D^a _____ colegiado/a nº _____
por el colegio de Médicos de _____ en la especialidad de _____ he revisado el protocolo y (cuando proceda) prescrito la medicación específica de actuación en caso de emergencia.

Fecha y firma

Yo, _____ como padre/madre/tutor legal,
AUTORIZO el seguimiento de este protocolo y (si procede) la administración de los medicamentos que constan en esta ficha a mi hijo/a _____

Fecha y firma